

DESCRIPTION D'UN LAMELLIBRANCHE NOUVEAU DE L'ÎLE SAINT-PAUL,

PAR M. ED. LAMY.


Grâce à la bienveillante intervention de M. le Professeur Henri Hartmann, Chirurgien des hôpitaux, le Muséum National de Paris a reçu récemment une collection de coquilles rassemblée par feu M. André Deharme, Ingénieur des arts et manufactures.

Il s'y trouvait un tube contenant trois coquilles provenant de l'île Saint-Paul (Océan Indien) : la 1^{re} était déterminée *Margarita Lacazei* Vélain, et la 2^e *Purpura Magellani* Vélain; quant à la 3^e, elle était accompagnée de cette étiquette : «*Lyonsia*, île Saint-Paul : ne se trouve pas dans la thèse de M. C. Vélain » (1877, Faune des îles Saint-Paul et Amsterdam, *Arch. Zool. expér. et gén.*, VI, p. 1-144, pl. I-V).

Ce *Lyonsia* me paraît différent des espèces jusqu'ici connues, et je crois devoir le décrire, en lui attribuant le nom de *L. Velaini*.

Lyonsia Velaini nov. sp.

Testa transverse ovato-oblonga, sat convexa, tenuis, pallide lutescens, æquivalvis, subæquilateralis; latus anticum rotundatum, latus posticum attenuatum, in rostrum truncatum desinens; margo dorsualis antice convexus, postice concavus; margo ventralis arcuatus, sub rostro distincte sinuatus; angulus ab apice usque ad rostri extremitatem decurrit. Valvæ extus striis ac



Lyonsia Velaini n. sp.

1. Valve droite, face externe; 2. Valve gauche, face interne. — Gross. 4.

plicis incrementi ornatæ. Umbones medii, postice inclinati. Cardo medio fossula ligamentari triangulari munitus. Impressiones musculares conspicuæ, antica ovato-oblonga, postica magis rotundata. Sinus pallii arcuatus, minime profundus.

Diam. ant.-post. : 8 millim.; diam. umbono-ventr. : 5 millim.; crass. : 4 millim.

Coquille ovale transverse, assez convexe, mince, d'un jaune pâle, équivalve, presque équilatérale; région antérieure arrondie; région postérieure rétrécie, terminée par un rostre court et tronqué; bord dorsal convexe en avant, concave en arrière; bord ventral arqué et pourvu, à proximité du rostre, d'un léger sinus; un angle relie le sommet à l'extrémité du rostre. Valves ornées extérieurement de stries et de plis d'accroissement. Sommets médians, inclinés en arrière. Charnière présentant un cuilleron ligamentaire central triangulaire. Impressions musculaires assez nettes, l'antérieure ovale allongée, la postérieure plus arrondie. Ligne d'impression palléale avec un très faible sinus arqué.

Cette coquille ressemble beaucoup à une espèce des eaux saumâtres de Madras, le *Lyonsia Morgani* Chaper (1885, *Bull. Soc. Zool. France*, X. p. 50, pl. I, fig. 19-21).